

輸血治療之護理指導

■輸血治療

- 用於嚴重外傷出血、手術失血
 - 目的是恢復血液容積、增進血液攜氧之功能
 - 癌症患者補充流失或製造不足之血液成份如；輸注白血球增強抵抗力，補充凝血因子及血小板改善凝血功能以達到控制及預防出血等症狀
 - 輸注減除白血球的血品，可改善輸血不良的反應，但此治療需經由醫師評估診療確認後方可進行
- 在您接受輸血治療過程中或輸血完畢返家後，若有發生下列過敏症狀時，應立即返回醫院急診室求治：**
- 顏面潮紅、皮膚搔癢並有蕁麻疹、眼皮及嘴唇水腫。
 - 血壓下降伴有紅疹、心跳加速、心悸、胸痛且感到煩躁不安。
 - 乾咳、輕度呼吸急促及頭痛、支氣管痙攣。
 - 畏寒之感覺而有發冷或寒顫，並有發燒的現象。
 - 突然解血尿

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

輸血治療之護理指導

■ 複習一下

- 問題1:()輸血治療用於手術失血、嚴重外傷出血、癌症患者。
- 問題2:()補充凝血因子及血小板改善凝血功能。
- 問題3:()輸血過敏反應血壓下降、突然解血尿、支氣管痙攣。
- 正確答案:問題1(0)、問題2(0)問題3(0)

參考資料:

李佳昂、羅仕錡(2022)·過敏輸血反應案例·台灣血液安全監測網絡年報·33-35。

http://doi.org/10.30029/THNAR.202206_2021.0010

高睿汝、林佳蓉、陳昭文(2021)·明智選擇：不需於輸血前常規使用抗組織胺·醫療品質雜誌，15(6)，50-54。<http://doi.org/10.3966/199457952021111506009>

郭夙峯(2019)·減除白血球血品提升輸血品質與安全·彰基醫療健康防治季刊，(37)，14-15。

[http://doi.org/10.6527/PVMN.201909_\(37\).0006](http://doi.org/10.6527/PVMN.201909_(37).0006)

- 諮詢電話:(02)2737-2181 分機1663
- 制訂單位/日期:26病房/1110826
- PFS-3800-017



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮