

注射Zoladex/Leuplin depot 護理指導單

■ 適應症

- 停經前後或更年期婦女之乳癌治療。
- 子宮內膜異位症、子宮肌腺症之治療。
- 手術前薄化子宮內膜及縮小子宮肌瘤。
- 人工受孕前輔助用藥。

■ 用法/保存方式

1	Zoladex depot 3.6 mg	每28天皮下注射一次
	Leuplin depot 3.75mg	
2	ZOLADEX LA depot 10.8mg	每三個月皮下注射一次
	LEUPLIN depot 11.25mg	

本藥品無須放置冰箱，需儲存於25°C以下，避免陽光直射。

■ 副作用

- 注射部位偶有輕微瘀血。
- 可能會有熱潮紅、流汗、頭痛、陰道乾澀與胸圍減小等停經的副作用。

本品注射會造成假性停經，一旦停藥副作用即會改善，可補充鈣質高的牛奶、小魚乾等食物避免骨質疏鬆。

■ 注射時間

第一劑需於月經來潮三天內或依醫師囑咐注射，已有藥物者無須掛號，請帶著(1)您的健保卡、(2)注射單及(3)藥物至第三醫療大樓1F注射室施打針劑。

注射室施打時間：W1-W5 09:00-20:00 & W6 09:00-12:00。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 其他注意事項

- 尚未停經者，接受藥物治療之後，月經會於最後一劑的45-60天來潮，無生育計畫者仍需採取避孕措施。
- 少數人在施打Zoladex或Leuplin depot第一劑後約2個禮拜會有出血情形，血量會較經期多，此為正常現象，施打第二劑之後則不會有出血情形。

■ 複習一下

問題1：() Zoladex或Leuplin領藥返家後均須採冷藏方式保存藥品。

問題2：() 注射Zoladex或Leuplin會造成假性停經，停藥後副作用即會改善。

問題3：() 尚未停經者，接受藥物治療之後，若無生育計畫仍需採取避孕措施。

正確答案

問題1：X 問題2：○ 問題3：○

參考資料：

[Yutaka,O., Pao,L.T.,& Cherng,J. J.](#)(2019) Clinical studies investigating the use of leuprorelin in Asian women with endometriosis: a review. Journal of Obstetrics and Gynaecology.39(3),291-296. <https://doi.org/10.1080/01443615.2018.1460584>

Nadia,H.M., Anmar A.-T,&Zahraa,A.(2020) Evaluation of goserelin effectiveness based on assessment of inflammatory cytokines and symptoms in uterine leiomyoma. Int J Clin Pharm. 42(3)931-937. doi: 10.1007/s11096-020-01030-3.

- 諮詢電話：02-27372181 分機8511
- 制訂單位/日期：5A病房/111.07.14
- PFS-8100-029



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮