

# 胎盤早期剝離

## ■ 疾病簡介

胎盤是負責母體與胎兒間養分及氣體的交換，正常是胎兒出來後胎盤才從子宮壁剝離下來，若懷孕中胎盤與子宮分開，就稱胎盤早期剝離。

胎盤早剝會增加產後出血、瀰漫性血管內凝血、早產、新生兒窒息、新生兒低體重及新生兒入住加護病房等風險，是懷孕中的一種嚴重併發症，進展快且急迫，若不及時處理會有危及母親和胎兒生命之情形。

## ■ 常見症狀

- 陰道發生出血情形:出血量較多，顏色暗紅
- 腹部持續疼痛的狀況，發現觸摸子宮硬如板狀，有壓痛
- 孕婦經常感到胎兒過度的胎動
- 合併噁心、嘔吐，以至臉色蒼白、盜汗

## ■ 檢查

- 超音波檢查及抽血檢查

## ■ 處置

- 若發生持續出血、胎心音異常、胎動減少，可能需立即採剖腹生產。

## ■ 急性照護

- 入院觀察，醫師評估給予緊急治療及處置。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 居家保健

- 加強產前檢查及保健、每日胎動監測、避免勞累及腹部撞擊及血壓控制良好。

## ■ 緊急返院提醒

- 陰道流血，出血量較多，顏色暗紅，腹部疼痛厲害。
- 出現噁心、嘔吐，以至臉色蒼白、盜汗。
- 發現觸診子宮硬如板狀，有壓痛。

## ■ 複習一下

問題1:( )胎盤早期剝離是在胎兒出生之前，就全部或部分從子宮壁剝離下來，通常無症狀可查覺。

問題2:( )胎盤早剝症狀有:暗紅色出血量多、腹部持續疼痛、觸摸子宮硬如板狀，而孕孕婦感到過度胎動。

問題3:( )是妊娠晚期的嚴重併發症，進展快且急迫，若不及時處理會有危及母親和胎兒生命之情形。

正確答案

問題1:X 問題2:O 問題3:O



參考資料：

王淑芳(2017)·高美玲總校閱·實用產科護理學·(八版)·台北市：華杏

QIU, Y. *et al.* Clinical analysis and classification of placental abruption. **The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians**, [s. l.], v. 34, n. 18, p. 2952–2956, 2021. DOI 10.1080/14767058.2019.1675625. Disponível em:

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=31608779&lang=zh-tw&site=eds-live&scope=site>. Acesso em: 14 out. 2021.

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8521
- 制訂單位 / 日期：產房/111.06.15
- PFS-8100-458

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮