

引產與催生用藥

■ 前言

分娩自然起動，是指不使用藥物情況下產程自然開始；用藥目的是避免胎兒過大、過期妊娠、產程遲滯或有醫學上的建議進行引產及催生，使用藥物前需要經過您的醫師評估及充分的說明，並且於待產過程中，需持續以母胎監測器監測您的宮縮及寶寶胎心音狀況。

■ 引產

又稱為誘發分娩，無任何產兆的孕婦，子宮還沒發生自然收縮前，用藥引發宮縮。

■ 催生

是加強的意思，產兆已經自然發生，但評估產程沒有進展，用藥物加速產程進展。

■ 前列腺素E2 (PGE2)

- 作用：為陰道塞劑，主要作用於子宮頸，可以促進子宮頸的軟化及成熟，並會漸漸地引起陣痛。
- 副作用：胃部不適、噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、眩暈等。

■ 前列腺素E1 (PGE1)

- 作用：為陰道塞劑，具有促子宮頸軟化與刺激子宮收縮作用，亦會使用在產後出血的預防與治療；其效果比PGE2更強更快，使用上需更謹慎。
- 副作用：輕度或暫時性的噁心、頭痛、頭暈及腹部不適。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

引產與催生用藥

■ 催產素(Oxytocin)

- 作用：刺激子宮平滑肌，使子宮產生規律的收縮，用於催生及治療原發性及續發性子宮無力及產後出血的預防與治療。
- 副作用：血壓上升、心律不整、噁心嘔吐、腹瀉、頭痛、腹痛。

■ 複習一下

- 問題1：() 使用引/催產藥物應經過醫師評估並且給予充分說明後執行。
- 問題2：() 使用引/催產藥物期間需密切監測母胎狀況。
- 問題3：() 只要想生產，不論原因及週數都可以和醫師要求使用引/催產藥物。

正確答案

問題1：○ 問題2：○ 問題3：X

參考資料：

王淑芳、張宏江、江曉菁、萬美麗、曾英芬、黃美荏…廖怡惠等 (2017) · 實用產科護理 (再版) · 台北市：華杏。

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8522
- 制訂單位 / 日期：產房/111.09.29
- PFS-8100-433



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮