

肝細胞癌

■ 疾病簡介

肝癌先是有一個或數個起因(如B型肝炎或C型肝炎)，經肝硬化及細胞癌化的階段，最後形成肝癌。

■ 常見症狀

早期幾乎沒有症狀，隨著病情的進展；晚期症狀包括右上腹疼痛、體重減輕、腹脹、黃疸、食慾不振、發燒、黃疸及腹水等。

■ 檢查

- 血液檢查：(AFP)可以作為肝癌的腫瘤標記。
- 腹部超音波：評估肝癌大小、位置、是否有侵入血管或膽管。
- 電腦斷層掃描、磁核共振攝影：可彌補超音波可能存在的死角，是目前做為肝癌確診的工具。
- 血管攝影：已很少用在肝癌診斷，但若AFP上升，而其他檢查都無法發現肝癌時，仍可能會考慮安排。
- 肝穿刺檢查：取出病灶組織進行病理化驗，以確認腫瘤分期。

■ 處置

肝癌治療需視肝臟功能受損嚴重程度及病人耐受性決定；常見--

- 手術切除：需評估肝功能、腫瘤數目、大小及位置。
- 電燒治療：手術外另一優先選擇，運用熱能讓癌細胞壞死。
- 肝動脈栓塞：由阻斷肝動脈對肝癌細胞的營養供給，並將化療藥物直接送到肝癌細胞區域。
- 酒精注射：超音波導引下做純酒精注射治療。
- 其它治療：化學藥物治療、放射線治療、質子療法、荷爾蒙治療、免疫療法、標靶治療、肝臟移植、肝動脈灌注化療等。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 保健照護

- 營養處置：適當熱量、維持理想體重、適量攝取蛋白質、避免高脂肪。
- 禁酒：酒精會加重肝臟的負擔。
- 充分休息減少疲倦感。

■ 緊急返院提醒

- 如出現一日解多次血便、黑便或任何出血等現象請速返院就醫。

■ 複習一下

問題1:肝癌最常見症狀包括右上腹疼痛、體重減輕、腹脹、黃疸、食慾不振、發燒、黃疸及腹水等

問題2:可以藉由肝動脈栓塞完全將癌細胞清除。

問題3:飲食上需增加高蛋白質、高脂肪及適當酒精。

正確答案：

問題1:○ 問題2:X 問題3:X



參考資料

肝病防治學術基金會全球資訊網(2021年5月)·肝癌對策--肝癌病友手冊·取自

https://www.liver.org.tw/uploadfile/fileperiod_news02_category/2_1619742957.pdf

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機1662
- 制訂單位/制(修)訂日期日期：26病房/1111115
- PFS-8100-406

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮