

注射Zoladex/Leuplin depot 護理指導單

■適應症

- 停經前後或更年期婦女之乳癌治療。
- 子宮內膜異位症、子宮肌腺症之治療。
- 手術前薄化子宮內膜及縮小子宮肌瘤。
- 人工受孕前輔助用藥。

■用法/保存方式

1	Zoladex depot 3.6 mg Leuplin depot 3.75mg	每28天皮下注射一次
2	ZOLADEX LA depot 10.8mg	每三個月皮下注射一次
	LEUPLIN depot 11.25mg	

藥品無須放置冰箱，儲存於室溫25°C以下，避免陽光直射。

■副作用

- 注射部位偶有輕微瘀血。
- 可能會有熱潮紅、流汗、頭痛、陰道乾澀與胸圍減小等停經的副作用。
- 本藥物會造成假性停經，一旦停藥副作用即會改善。

■注射時間

第一劑需於月經來潮三天內或依醫師囑咐注射，已有藥物者無須掛號，請帶著(1)您的健保卡、(2)注射單及(3)藥物至第三醫療大樓1F注射室施打針劑。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■其他注意事項

- 尚未停經者，接受藥物治療之後，月經會於最後一劑的45-60天來潮，無生育計畫者仍需採取避孕措施。
- 少數人在施打Zoladex或Leuplin depot第一劑後約2個禮拜會有出血情形，血量會較經期多，此為正常現象，施打第二劑之後則不會有出血情形。

■複習一下

問題1：()Zoladex或Leuplin領藥返家後於25度室溫中保存藥品即可。

問題2：()注射Zoladex或Leuplin會造成假性停經，停藥後副作用即會改善。

問題3：()尚未停經者，接受藥物治療之後，若無生育計畫仍需採取避孕措施。

正確答案

問題1： 問題2： 問題3：

參考資料：

TerSera Therapeutics. (2023). Zoladex 3.6 mg [prescribing information]. Lake Forest, IL: TerSera Therapeutics.
AbbVie Inc. (2024). Lupron Depot: Package insert / prescribing information. <https://www.drugs.com/pro/lupron-depot.htmlDrugs.com>

諮詢電話：02-27372181 分機8511

制訂單位/日期：5A病房/1141201

PFS-8100-029

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮