


靜脈注射輸液之護理指導

■ 靜脈注射輸液注意事項

- 每四天予以更換靜脈注射的部位
- 請保持輸注的點滴瓶高於病人的注射部位 50 ~ 90 公分，以免管路回血導致阻塞
- 護理師已將滴數調好，請勿自行調整流速，以免影響藥物作用
- 靜脈注射的肢體仍可輕微活動以促進血循，避免肢體腫脹
- 當發現點滴管路中有回血時，不必驚慌，先將點滴瓶提高，注射部位放低，並通知護理師處理
- 點滴注射時，請勿拉扯或壓摺管路，以防阻塞及滑脫
- 若注射關節處時，請勿彎曲關節處以免阻塞，並請儘量使用未打針的手處理其他事務
- 下床活動時，可向護理站借用活動點滴架，並使用未注射的手來推移活動點滴架
- 請保持注射部位乾燥，若有紅、腫、熱、痛時，請立即通知護理人員處理



距離 50 ~ 90公分



避免拉扯壓摺管路




儘量用未打針的手
處理事務



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 使用幫浦輸液之注意事項



- 臥床休息時：請將插頭插上充電
- 下床時：將機器管線收好，避免拉扯纏繞
- 坐輪椅時：注意管路收緊，避免卡住輪子
- 如廁時：如遇門檻，請護理師或家屬協助，注意點滴架平衡
- 輸液幫浦機器請勿自行拆卸，避免砸落受傷

■ 複習一下

問題 1: () 當發現點滴管路滴很慢時，我可以自己調快一點

問題 2: () 接受靜脈注射的肢體應低於點滴瓶，距離至少

50~90公分，以避免管路回血阻塞

問題 3: () 注射部位感到紅腫疼痛是正常的，不用告訴護理師

正確答案:問題1× 問題2○ 問題3×

參考文獻

蘇麗智等(2024)•實用基本護理學(下冊)•華杏。

Nickel, B., Gorski, L., Kleidon, T., Kyes, A., DeVries, M., Keogh, S., Meyer, B., Sarver, M. J., Crickman, R., Ong, J., Clare, S., & Hagle, M. E. (2024). Infusion Therapy Standards of Practice, 9th Edition. *Journal of infusion nursing: the official publication of the Infusion Nurses Society*, 47(1S Suppl 1), S1–S285.
<https://doi.org/10.1097/NAN.0000000000000532>

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 1300

制訂單位 / 日期：護理部/114.12.01

PFS-8100-682



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮