

白內障

■ 疾病簡介

白內障是水晶體混濁；最常見的病因是老化，其他原因也包括家族病史、高度近視、內科疾病如糖尿病、眼睛外傷、藥物的使用(如類固醇)、眼睛長期、直接暴露在陽光下、曾施行眼部手術。

■ 常見症狀

- 無痛;視力漸退、單眼複視、夜晚視力差。
- 對色彩感光減退、對光敏感、覺得刺眼。
- 時常須更換眼鏡處方。
- 閱讀時需更強的光線。

■ 檢查

- 視力檢查：測量視力。
- 測量眼壓：測量眼壓。
- 眼底檢查：透過眼底鏡直接穿過瞳孔查看眼睛後方，包括視神經、神網膜、黃斑部是否出現病變。

■ 處置

- 白內障手術，一般採取局部麻醉，混濁的晶體先被摘除，然後放置一個永久的人工水晶體來恢復屈光力。



白內障

■ 急性照護

- 術後頭部需略為抬高,避免睡向患眼側。
- 避免腹部用力、急速平躺坐起或蹲下站起、提重物或從事粗重工作。
- 依醫囑用藥,鐵眼罩及敷料依醫師指示才可拿掉。
- 術後患眼有輕度疼痛是正常的,按時服用止痛藥以減輕疼痛不適。
- 洗臉用毛巾擦拭,沐浴時避免髒污的水直接進入患眼造成感染,洗頭仰臥,勿讓水跑入眼內。

■ 居家保健

- 依醫師指示時間回診,並按時點藥。
- 自由活動,避免跑步、游泳、腹部用力、急速平躺坐起或蹲下站起、提重物或從事粗重工作。
- 勿進食刺激性食物避免辛辣、煙、酒等刺激性食物,避免咀嚼硬物,多吃蔬菜水果多喝水,預防便秘,有內科疾病如:糖尿病、高血壓等,依照醫師指示執行飲食控制。
- 注意日常生活安全,避免跌倒或碰撞。
- 白天戴太陽眼鏡,可避免強光及外傷,短期內睡覺時必須使用鐵眼罩,預防不自覺抓傷。

■ 緊急返院提醒

- 眼睛若有持續性疼痛、劇痛、脹痛或視力驟退、不正常出血等症狀。
- 不慎撞擊到患眼時。
- 眼睛有異常分泌物。

本衛教資訊經眼科醫師檢視,所有衛教資訊內容僅供參考使用,無法提供任何醫療行為和取代醫師當面診斷

- 諮詢電話:(02)2737-2181 分機 3200
- 制訂單位/日期:眼科/112.05.10
- PFS-3300-002

本單僅供參考,實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮