

嬰幼兒腹瀉護理指導單

- 若發現嬰幼兒大便次數增加，形狀變稀、血便或有黏液，顏色味道異常時，應立即就醫。
- 停止或減少副食品之攝取。
- 不要擅自改變牛奶濃度（須由醫師指示）。
- 請遵照醫師之指示服藥，不可亂服成藥。
- 奶瓶奶嘴要消毒。
- 照顧者應於照顧嬰幼兒前後洗淨雙手。
- 注意尿布乾爽清潔；重複式尿布最好經洗淨、曬乾後後再行使用，如遇天雨日曬不易，可用電熱器或熨斗燙乾。
- 如有紅臀更需更勤換尿布，使用醫師處方的藥膏局部塗擦。
- 如有發燒避免使用肛門栓劑退燒，可先使用口服退燒藥。

■ 複習一下

問題1: () 奶瓶及奶嘴要消毒

問題2: () 照顧嬰幼兒前後需洗淨雙手

問題3: () 可以自行改變牛奶濃度

正確答案

問題1: ○ 問題2: ○ 問題3: X



參考資料：

陳月枝等/編著（2016）·實用兒科護理·臺北市：華杏

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8533

制訂單位 / 日期：新生兒觀察室/111.09.27

PFS-8100-040

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮