

川崎氏症

■ 疾病簡介

- 川崎氏病(Kawasaki Disease)也稱為皮膚粘膜淋巴結症候群，是兒童最常見的血管炎之一，目前無法預防，感染原因尚不明，在台灣有90%以上是發生在5歲以下的兒童，可能引起心臟動脈方面的合併症。

■ 常見症狀

- 標準診斷: 1.發燒 \geq 5天、2.雙眼結膜發紅、3.腫脹的舌頭上有白色分泌物狀或稱為“草莓舌”、4.軀幹或四肢甚至會陰部出現皮疹脫屑情形、5.腫脹的前頸淋巴結、6.手掌及足部腫脹發紅。

■ 檢查

- 血液檢查: 血球數、發炎指數、電解質等。
- 心臟超音波: 確認是否有冠狀動脈擴張的心肌發炎跡象。

■ 處置

藥物治療：在黃金治療期內使用阿斯匹靈，以及免疫球蛋白IVIG注射，可減少發燒的時間、全身性發炎症狀及冠狀動脈損傷等。

■ 急性照護

- 配合指示服用藥物，並觀察有無不適反應。
- 注意補充水分，維持病童口腔黏膜的清潔，避免過熱或刺激性食物，保持皮膚清潔，使病童感到舒適。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■居家保健

- 若有接受免疫球蛋白注射時，至少需等待6至9個月後，才可接受疫苗注射(如麻疹、小兒麻痺疫苗等)，詳細情形可向醫生詢問。
- 病童需追蹤心臟功能，請依指示定期接受心臟超音波檢查。

■緊急返院狀況提醒

如發生發燒不退、精神變差等症狀，應請速返院就醫。

■複習一下

問題1：()川崎氏症診斷標準其中之一為發燒大於5天。

問題2：()川崎氏症患者可能會有心臟異常情形。

問題3：()必要時遵照醫師醫囑需使用阿斯匹靈及免疫球蛋白。

正確答案

問題1：○ 問題2：○ 問題3：○

參考資料：

Robert Sundel, (2016). Kawasaki disease: Clinical features and diagnosis. Retrieved from <https://is.gd/zPaRWE> 衛生福利部疾病管制署

Rife, E., Gedalia, A. Kawasaki Disease: an Update. Curr Rheumatol Rep 22, 75 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11926-020-00941-4>

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8711
- 制訂單位/日期：7A病房/111.09.15
- PFS-8100-428



本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮