

下背痛 (Low Back Pain)

■ 疾病簡介

根據研究，約有60~80%的人在一生中經歷過下背痛的症狀。下背痛發生的部位通常在第四、五腰椎或第五腰椎和第一薦椎間，所以也俗稱腰痛，但下背痛只是一種症狀，而主要可分為與脊椎有關以及與脊椎無關的下背痛，與脊椎無關的下背痛可能因膀胱，腎臟等臟器引起，而大多數的下背痛是與脊椎有關的，包括：

- 軟組織引起的疼痛：肌肉、肌腱、韌帶的拉傷扭傷，肌筋膜發炎等；
- 神經引起的疼痛：椎間盤突出，腰椎狹窄或退化性關節炎等都可能造成神經壓迫而疼痛；
- 關節引起的疼痛：關節炎、僵直性脊椎炎等所造成的疼痛；
- 骨頭引起的疼痛：例如脊椎滑脫、壓迫性骨折、脊椎崩解、脊椎側彎等；
- 其他因素：癌症、腫瘤、感染、情緒壓力、姿勢不良等。

■ 預防下背痛

■ 良好的姿勢及工作習慣：

- (1) 睡覺：平躺時，膝蓋下方墊枕頭；側躺時雙腳彎曲，中間夾個枕頭。
 - (2) 上下床：上床先坐在床邊，手撐床慢慢側躺後再翻身正躺；下床時先翻身側臥，再以手撐起身體再慢慢坐起。
 - (3) 坐站姿：勿同一姿勢維持超過15分鐘，座椅後方可加靠墊於腰部，減輕背部壓力，勿坐矮板凳或軟而低的沙發。若需長時間站姿，可輪流將腳放在矮凳上，並常更換姿勢。
 - (4) 搬物：舉重物時應將兩腳分開約45公分，一腳在前，另一腳稍微在後，膝蓋彎曲蹲下，保持背部平直，物品盡量靠近身體，兩腿用力站直，將物品舉起。
- 避免體重過重，保持良好體重
 - 運動：經由運動可強化背肌和腹肌，有助於預防背痛及避免背痛惡化。例如：游泳、散步及騎自行車等。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■運動治療

- 1.伸展運動：伸展腰部周邊肌肉，減輕腰部壓迫力。

(1)骨盆搖擺： 平躺，兩膝彎曲併攏。將兩膝向左右方擺動。各方向做20下。		(2)屈膝運動： 平躺，兩膝彎曲併攏。將兩膝抱到胸前，使背肌感到稍微緊。也可單獨伸展一邊。 每次30秒，每回五次，一天三回。	
(3)伸背運動： 趴姿，將上身推起，使背肌感到稍微緊。 每次做20下。		(4)單側腰肌伸展： 平躺，右腳屈膝，左手從膝蓋將其拉伸到左邊，使右邊腰肌感到稍微緊，另一側亦同。 每次30秒，每回5次，一天三回。	
(5)梨狀肌伸展： 坐姿，左腳翹二郎腿到右邊，雙手從膝蓋將其拉伸到右邊，使左邊梨狀肌(外髖部與坐骨之間)感到稍微緊。 另一側亦同。 每次30秒，每回五次，一天三回。		(6)坐骨神經伸展： 躺姿，用毛巾或繩子圈在腳板處，將腳向上拉伸使大腿後肌感到稍微緊。 另一側亦同。 每次30秒，每回五次，一天三回。	

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■2. 肌力訓練：加強腰部周邊的肌力，以維持腰椎的穩定。

(1)縮小腹運動： 平躺，縮小腹力， 將腰貼平床面(下 方可放一捲小毛 巾)，每個動作每 回20下，一天三回		(2)抬臀運動： 下肢彎曲，將屁股 抬離床面，注意要 持續呼吸，不要憋 氣。 每個動作每回20- 下，一天三回。	
(3)屈膝仰臥起坐： 平躺，兩膝彎曲併 攏。雙手摸膝(注 意不要過度彎腰及 憋氣)每個動作每 回20下，一天三回		(4)上下背肌運動： 趴姿，將上身抬離 床面(胸口離床)及 單腳向上抬離床面 (膝蓋大腿稍微離 床)。每個動作每 回20 下，一天三 回。	

■活動原則及小叮嚀

- 若運動後有疼痛情形請立刻停止，並告知物理治療師尋求協助。
- 下背痛的原因可以從很簡單的肌肉緊繃到癌症轉移都有可能，所以還是建議給予醫療人員詳細的評估及檢查，才不會延誤治療的時機。

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 1241#18
- 制訂單位 / 制(修)訂日期：復健醫學部物理治療組/1110415
- F-4200-OR-001

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮