

# 乳癌術後物理治療

## ■ 疾病簡介

隨著醫療進步，乳癌患者的存活率上升，相對的，病患在接受手術或化放療等療程後的後遺症越常見。乳癌常見的手術為乳房保留手術與改良式根治乳房切除術，淋巴部分可以做前哨淋巴切片檢查或腋下淋巴廓清術。由於侵入手術影響原有的構造，因此會帶來部分併發症，術後復健運動的地位扮演舉足輕重的角色。

## ■ 症狀

- 傷口周圍出現麻痛感
- 患肢肌肉無力
- 肩部主動關節活動受限
- 淋巴水腫
- 姿勢不良造成頸部及背部疼痛
- 因療程造成全身性疲勞
- 因療程造成易骨質疏鬆
- 心理層面問題
- 乳房幻覺痛傷口附近組織沾黏或乳房重建後的莢膜沾黏

住院急性期運動 ◁ 出院亞急性期運動



改善淋巴水腫 ◁

居家簡易活動 ◁



## ■ 術後物理治療

- 皮膚照護：避免患肢外傷、拉傷、曬傷、蚊蟲叮咬，可以塗抹乳液保濕避免皮膚乾裂。另外如注射點滴、抽血、量血壓與針灸等侵入性醫療行為，只能在健側施行。
- 呼吸運動：避免傷口沾黏及疼痛造成呼吸受限，強調擴胸運動，以及用鼻吸嘴吐的方式深呼吸。
- 主動關節活動：包含肩、肘、腕關節活動，避免關節攣縮及僵硬。
- 徒手淋巴引流：目的為促使淋巴液的回流，並軟化纖維化的區域。技巧大至上採取慢、輕、由遠端至近端、由外側至內側為原則。
- 壓力治療：分成伸縮性繃帶、壓力衣、淋巴循環機三種，主要藉由壓縮的力量維持經徒手淋巴引流後的成果，每天建議20小時以上。
- 運動治療：利用肌肉主動收縮形成幫浦作用輔以患肢抬高，達到增加淋巴回流的效果，同時也維持病患的肌力與關節活動度。
- 有氧運動：維持或提升整體心肺體適能，促進全身性循環。



## ■ 運動內容

- 躺姿或坐姿下，上肢前舉與抓握：患肢上舉至與肩同高，手一握一放做抓握運動。



- 躺姿或坐姿下，上肢側舉與抓握：患肢側向張開至與肩同高，手一握一放做抓握運動。



- 坐姿下，聳肩繞肩活動：患肢肩膀靠近耳朵向上以及向後繞圈。

## ■ 活動原則及小叮嚀

- 手術後第二天即可開始執行，依照個人疼痛程度，增減活動幅度，住院期間患肢不高舉過肩，以不造成傷口額外負擔為原則(10下/回，3-5回/天)。
- 活動過程中患肢有紅熱腫痛加劇的現象，請立即停止活動，並尋求醫師或治療師的協助。
- 乳癌切除乳房之患者所引發的淋巴水腫，切記避免手提重(大於2公斤)或長時間維持手臂下垂的動作。
- 有任何問題請洽詢物理治療師，並建議出院後一周回診復健科追蹤。

■ 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 1241#18

■ 制訂單位 / 日期：復健醫學部物理治療組/110.09.10

■ F-4200-CA-001

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮