

恆牙外傷注意事項

■ 簡介:

- 在成長的過程中，容易因為跌倒或其他原因而外傷。若傷及牙齒，可能會造成以下問題。傷害在撞擊的一瞬間就造成，後續的治療是為了早期診斷，降低傷害。
- 恆牙神經壞死，外觀顏色會變灰黑、粉紅色，或是牙齦會有膿包。對冰熱疼痛、痛到睡不著、影響進食等。
- 牙齒搖動，牙齒搖動度增加。
- 恆牙牙根彎曲或斷裂。

■ 照顧時請注意:

- 外傷後幾天，飲食上需吃軟的食物，以免二度傷害。
- 避免一直去搖動外傷過的牙齒。
- 撞擊後需定期照 X 光片，並仔細觀察其顏色、搖動度、有無膿包等。
- 請加強口腔衛生，以免細菌量過多而造成周邊牙齦感染或二度蛀牙。
- 若有使用鋼線固定，需在 14 天內拆除，請配合約診時間回診。並請加強口腔衛生。
- 若使用樹脂復形斷裂處，需注意勿用樹脂咬硬的，不然容易脫落。
- 若斷裂範圍較大，等年齡較大(約高中時)時，配合度較高時，可轉診至假牙科以貼片或假牙復形。

諮詢電話：(02)27372181 分機3211-1

制訂單位/制(修)定日期：兒童牙科/1130308

PFS-3900-018

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮