

# 兒童全身麻醉術前術後注意事項

## ■ 為增進治療的安全性，敬請家長詳細閱讀並配合下列事項：

- 健康狀況，若臨時發生感冒、咳嗽、發燒或腹瀉等身體不適時要通知醫師，再決定是否改日接受治療。
- 服藥方面，請依醫師指示服用定期服用的藥物〈如抗癲癇藥物〉。
- 飲食方面，為了避免麻醉時嘔吐及避免肺部感染，超過凌晨 12:00 就不可再服用任何食物，喝水或喝母乳。否則，為了安全起見，手術可能取消。

## ■ 手術當天早上：

- 通常為第一台刀，可由父母一人陪同進入。
- 因為年齡小，故麻醉過程會有哭鬧情形，為正常現象。為安全起見，會有醫療人員幫忙固定。
- 手術時間通常為 4-6 小時，若超過健保補助的時間，需自費超過的麻醉費用。
- 進入開刀房後，會進行麻醉插管。插管過程中一定會有摩擦，故有時術後會有短暫流鼻血，為正常現象，注意保溼止血即可。
- 進入開刀房後，會替您的小孩拍攝全口 X 光片，以了解其齲齒情形及骨頭有無感染的。確切的治療計畫(確切的牙套顆數，及需拔除的牙齒顆數)，會在拍攝完 X 光片後，才能決定。
- 因手術時間較長，可以先去附近吃飯，但要留可以聯絡的手機給開刀房。或在手術房外面等也可以。



## ■ 手術結束：

- 手術結束後，會在恢復室休息，可準備小孩喜歡的影片或娃娃。
- 等到孩子狀況穩定，會安排離院。
- 離院後，可以先服用少量的清水及清澈液體(如蘋果汁或舒跑等)，嘗試以上步驟時，請慢慢來，不要喝太多太快，若有嘔吐情形，請先休息。等孩子有餓的感覺時，再少量進食清淡的食物(如清粥)，先不要吃太豐盛，以免消化不良。

## ■ 術後注意事項：

- 疼痛:全身麻醉後會有疲倦、肌肉酸痛及喉嚨痛的現象，一兩天內會改善，傷口的疼痛可服用醫師處方的止痛藥。麻醉插管過程中可能會有摩擦鼻黏膜情況，故有時術後會短暫流鼻血，為正常現象，注意保溼止血即可。
- 飲食:離院後，可以先服用少量的清水及清澈液體(如蘋果汁或舒跑等)，嘗試以上步驟時，請慢慢來，不要喝太多太快，若有嘔吐情形，請先休息。等孩子有餓的感覺時，再少量進食清淡的食物(如清粥)，先不要吃太豐盛，以免消化不良。
- 暈眩虛弱:請多休息。請家長注意，以免跌倒。搭車回家時，一定要有人保護孩子，以免煞車時撞到頭。當日建議不要讓孩子獨處。
- 高體溫:全身麻醉的後一天，可能會有輕微體溫較高的現象，請多補充水分。若出現持續性的發燒(超過 40 度)，必須返回醫院急診諮詢。
- 若有呼吸困難，持續性嘔吐發燒或其他異常請返回醫院就診。



- 若裝小鋼牙或白色牙套，在術後的 1~2 天會有不適應的情形，因此可選擇較軟的食物，三天後便會改善。請加強清潔，以免細菌量太多，引起發炎。可搭配使用漱口水+棉花棒擦拭周圍。
- 若是前牙有裝樹脂牙套，則請小朋友勿用前牙咬硬的食物或玩具，若有咬崩落，則可能需再收一次自費。若嚴重至無法復形，則可能要拔除。
- 若有拔牙，術後當天口水中有些血絲屬正常現象，如果發現拔牙傷口滲血，可先以紗布加壓止血。術後仍可刷牙。
- 術後 14 天內會安排回診，之後請三個月定期檢查，並請父母多留意孩童之口腔狀況。
- 若需開立診斷證明書，請於回診當日告知並拿取。可先電洽保險人員了解需要的份數。
- 如有任何問題，可來電或直接來本院檢查，謝謝您的配合。

諮詢電話：(02)27372181 分機3211-1

制訂單位/制(修)定日期：兒童牙科/1130308

PFS-3900-020

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮