

門診舒眠麻醉注意事項

■ 過敏症狀：

- 鼻過敏食物過敏 例如：花生、蛋白、沙拉油？麻醉藥品？

■ 系統性疾病：

- 癲癇心臟病氣喘糖尿病高血壓甲狀腺
- 其他-_____

■ 睡眠呼吸方式：

- 口呼吸 鼻呼吸 睡眠呼吸中止症

■ 麻醉諮詢後，請詳閱簽名並當日帶至牙科

- 當日術前勿服用降血糖藥
- 氣喘、降血壓、癲癇或甲狀腺藥物可按時服用(飲水量 30CC 內)
- 舒眠麻醉前已完成抽血、心電圖及麻醉諮詢
- 近一周未有感冒、發燒、流鼻水症狀
- 卸除手腳指甲彩繪或光療
- 舒眠麻醉前請再次勾選確認上述注意事項與簽名，當日務必連同麻醉同意書帶至牙科報到，感謝配合。



■ 什麼是舒眠麻醉：

- 「舒眠麻醉」是全身麻醉的一種，不使用氣體麻醉，直接從靜脈給予少量麻醉藥物與止痛藥，先待患者睡著後，即可開始進行手術或檢查。
- 孩童及特殊病患若無法配合靜脈注射，會於臀部或手臂肌肉注射鎮靜藥物，待藥物發揮作用後再進行靜脈注射，此時請家屬在外等候即可。
- 麻醉過程中會全程接上生理監視器(心電圖、血壓、血氧飽和濃度測量儀等)，以利監測術中生命徵象。

■ 為什麼手術前要禁食：

- 麻醉藥物的作用會減弱人體正常的保護性反射，若在麻醉中發生嘔吐，易把嘔吐物吸入肺中而引起吸入性肺炎；一旦造成吸入性肺炎，後果相當嚴重，例:缺氧、死亡等。為減少吸入性肺炎的發生，請遵循以下禁食時間(經特別指示的服藥除外)：
- 清水：2 小時
- 輕食清淡、低熱量且不含肉類：6 小時
- 油炸、含肉類或非母乳配方：8 小時

■ 常常喝酒會影響麻醉嗎？需要戒菸嗎？

- 酗酒者接受麻醉所需要的藥物劑量會比一般人更大，長期大量的酒精攝取會傷害身體各個器官，而提高麻醉的危險性；抽煙對於麻醉的影響也很大，會造成手術中呼吸道分泌物的增加，使咽喉痙攣及氣喘發生的機率增加，而延長手術後的恢復，且會造成血管收縮不利傷口癒合，並且增加感染的機會。因此，在手術前戒菸、戒酒，是絕對必要的。



諮詢電話：(02)27372181 分機3211-1

(02)27372181 分機3211-2

(02)27372181 分機3211-8

制訂單位/制(修)定日期：兒童牙科、家庭牙科、特殊牙科/1130308

PFS-3900-022

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮