

# 代謝症候群

## ■ 疾病簡介

代謝症候群不是一個特定的疾病，它是血壓、血脂、血糖、腰圍異常的統稱，是一個健康的危險訊號，這類病人的心血管疾病機會大大增加，死亡率是一般人的1.5至2.5倍。主要原因和肥胖、體能活動量不足、飲食習慣、胰島素阻抗、家族體質有關。

## ■ 症狀

依據2007年台灣國民健康署標準，以下5項危險因子中，若包含3項或以上者可判定為代謝症候群：

- 腹部肥胖：(腰圍:男性 $\geq 90\text{cm}$ 、女性 $\geq 80\text{cm}$ )。
- 血壓異常：收縮血壓 $\geq 130\text{mmHg}$ 或舒張血壓 $\geq 85\text{mmHg}$ 。
- 高血糖：空腹血糖值(FG) $\geq 100\text{mg/dl}$ 。
- 高密度酯蛋白膽固醇(HDL-C)：男性 $< 40\text{mg/dl}$ 、女 $< 50\text{mg/dl}$ 。
- 高三酸甘油酯(TG) $\geq 150\text{mg/dl}$ 。

## ■ 檢查

- 測量血壓、腰圍
- 測量身高、體重，計算身體質量指數(Body Mass Index, BMI)
- 血液檢查血糖、血脂。

## ■ 處置

- 健康飲食。
- 規律運動。
- 維持標準體重。
- 戒菸。
- 控制血壓、血脂、血糖。

## ■ 急性照護

- 依據主要症狀給予支持療法，並持續監測生命徵象，預防病情變化。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 居家保健

- 維持標準體重(BMI=18.5-24)。
- 健康飲食：減少油脂的攝取、選用植物性油脂、避免食用加工製品、攝取低熱量食物、避免飲用甜性飲料、每天多喝水、選用高纖食物增加飽足感、儘量減少含有高鈉的調味料。
- 規律運動：357運動原則~每次達30分鐘，每周五次，運動時每分鐘心跳數應達最大心跳數(220-年齡)的七成，大約是感到有點喘，但還能說話程度。建議以增強心肺血液循環功能的運動類型為主，如快走、游泳、有氧運動、慢跑、騎單車、舞蹈等等。運動後請補充水分。
- 健康生活習慣：戒菸、少喝酒、不熬夜、多走動、釋放壓力。

## ■ 緊急返院提醒

- 如血壓、血糖等控制不良且感身體不適，即建議應返院檢查。

參考資料：

Crowley K., Martin A. K., (2016). Patient education: Metabolic syndrome (The Basics). Retrieved from <https://www.uptodate.com>  
Meigs, J. B., (2016). Patient education: metabolic-syndrome(Beyond-the-basics). Retrieved from <http://www.uptodate.com>

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8011
- 制訂單位 / 日期：10A病房/109.07.27
- PFS-3700-001

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮