

抽血檢驗注意事項

- 飲食會影響少數生化檢驗結果的項目，如下：
Triglyceride（三酸甘油酯）、AC sugar（飯前血糖）、PC sugar（飯後血糖）。
 - Triglyceride（三酸甘油酯）、AC sugar（飯前血糖）、Lipo EP、ICG、C-peptide、Insulin：請一定要空腹8小時左右來抽血檢查，也不要空腹太久（超過10小時以上），以免影響檢驗結果，而影響醫師用藥治療的判斷。
 - PC sugar（飯後血糖）：應為飯後2小時抽血（是指開始吃第一口食物後2小時，不是吃完飯後2小時）。
- 在一天中不同的時段抽血，正常值（生物參考區間）會有不同的結果，例如：Cortisol, ACTH，上午濃度會比較高。請病人於指定時間抽血檢查，才不會影響醫師用藥治療的判斷。一般是早上07:00~10:00或下午16:00~20:00抽血。
- PFCT CoI/EPI、PFCT CoI/ADP請配合於週一至五12~13點抽血。
- 淋巴球標記CD4、CD8請配合於週一至五11點前抽血。
- Chromosome請配合於週一至四整天及星期五13:30前抽血。
- Quantiferon請配合於週一至五12點前抽血。
- 白血球、淋巴瘤檢查請配合於週二及週五9點前抽血。
- 細胞遺傳學檢查請配合於週一至週四10點前抽血。
- 尿液細菌培養，請病人依照【尿液細菌培養】衛教單，取中段尿液送檢。

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

- 24小時尿液收集，請病人依照【24小時尿液收集衛教單（一般）】或【24小時尿液收集衛教單（特殊）】收集24小時尿液送檢。
- 精液檢查，請病人依【精液採集注意事項】衛教單與醫師指示採檢，並務必於30分鐘內，送實驗診斷科檢驗，超過30分鐘會影響精液中活動力的報告判讀。
- 蟯蟲檢查，請病人依照【蟯蟲檢查膠片採檢注意事項】衛教單，採集送檢。
- Sputum Culture，請病人依照【痰液培養檢體收集注意事項】，收集痰液送檢。
- 淋病雙球菌及披衣菌RNA定性試驗請先至檢驗科領取容器，採檢前一小時內勿排尿，留前段尿20-30ml。
- 抽血服務時間：
- 第三醫療大樓1樓抽血櫃台
 - 星期一~五：7:00 ~ 21:00；星期六：7:00 ~ 13:00；(中午有二位值班人員服務)；星期例假日暫停服務。
- 蔡萬才癌症大樓
 - 星期一~五：8:30 ~ 17:30；星期六：8:30~ 12:30；(中午有一位值班人員服務)；星期例假日暫停服務。
- 颱風抽血公告：因應颱風特別門診，開放抽血時間有所調整-早上8點~門診時間結束。

諮詢電話：27372181 轉8150-53 或8465-71

制訂單位/日期：醫學檢驗科/111.11.15

表單編號：PFS-6100-001

本單僅供參考，實際治療以醫師診治為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮