

胃食道逆流飲食原則

- 以少量多餐為原則，吃到七分飽即可，不要暴飲暴食。
- 避免刺激性食物：
 1. 酒精飲料與碳酸飲料，如汽水、可樂，酸味強之果汁或水果，如烏梅、李子、鳳梨、檸檬汁、柳丁汁、番茄汁等。
 2. 辛香料，如：辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉。
 3. 其他：甜食、咖啡、茶、巧克力、醋、果醋等。
- 避免易產氣食物：
 1. 蔬菜：高麗菜、白花菜、青花菜、韭菜、青椒、洋蔥、蘆筍。
 2. 黃豆、毛豆、黑豆、豆腐、大量的豆漿。
 3. 所有奶類及乳製品、蛋黃。
 4. 全穀根莖類：地瓜、芋頭、玉米、紅豆、綠豆等。
- 飲食應減少脂肪含量，並避免攝取油炸食品及難消化糯米類製品。
- 進食後不要馬上平躺，至少須等30分鐘至1個小時，或可將床頭墊高15-20公分。
- 睡前2小時勿進食餐點，以免在睡眠當中胃內食物刺激胃酸分泌。
- 平日應保持排便通暢，減少脹氣、便秘的情形。
- 避免穿著過緊的衣服、腰帶或褲子。
- 進行戒菸，抽菸會降低食道括約肌張力。
- 維持適當體重，肥胖或體重過重者應減輕體重。

■ 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 3002

■ 制訂單位/日期：營養室/114.03.01

本單僅供參考，實際治療以營養師建議為主



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮