

主旨：瑞士醫藥管理局 (DHPC)及加拿大衛生部 (Health Canada)發布 使用 pembrolizumab 可能有 Stevens-Johnson syndrome (SJS) 與 toxic epidermal necrolysis (TEN)之風險

摘要說明:

依據 MSD 藥廠回顧使用 pembrolizumab 引起的 Stevens-Johnson syndrome (SJS)案件目前有 8 件(6 件於臨床試驗時發生,2 件於上市後監測發生),toxic epidermal necrolysis (TEN)目前有 2 件(皆在上市後監測發生),其中約有 11,000 人參與臨床試驗,上市後已約有 27,000 人接受 Keytruda 治療。

建議醫療人員注意事項:

- 用藥前應告知病人 pembrolizumab 有發生 SJS 與 TEN 之風險。
- 病人發生 SJS 與 TEN 應立即停用 pembrolizumab，並轉由專科醫師進行確認與處置；確認為 pembrolizumab 引起之 SJS 與 TEN 者應永久停用 pembrolizumab。
- TEN 與 SJS 特徵包括**敏感性紅斑可能發展成水疱或皮膚脫落，典型症狀會影響黏膜，隨後常出現畏光、感染症狀與發燒。**

醫療人員若懷疑病人因使用此藥品導致不良反應發生時，請立即到 **AERS 通報藥物不良反應。**

資料來源：[加拿大衛生部\(Health Canada\)](#)
[瑞士醫藥管理局 \(DHPC\)](#)

完整內容及詳細資料請點選連結