

藥品使用指導單

瑪爾胰[®]錠 (Amaryl[®] 2 mg)

■ 藥品成分名

Glimepiride

■ 藥品外觀

淺綠色，橢圓形錠劑兩面有刻痕，錠劑；大小：1.0 公分；標記：[M/S]

■ 作用

瑪爾胰[®]錠為口服的抗糖尿病製劑，主要治療第二型糖尿病，以控制您的血糖接近正常值。

■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間服用，按照醫生的指示，注意食物的攝取應該減量，多做運動。
2. 應在用餐前不久或用餐當中服用。
3. 如果是每日服用一次的話，可於早晨服用一次。

■ 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 可能增加您對光線的敏感性，請特別注意防曬。
3. 避免飲酒！飲酒可能增強或減弱 glimepiride 降低血糖的作用。
4. 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制糖尿病症狀，有助於您的健康。
5. 有些藥物可能會影響瑪爾胰[®]錠的血糖控制作用，因此若您有其他服用藥物請告知您的醫師或藥師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿驚慌：
腸胃不適、噁心、頭痛、缺乏食慾、體重改變。
2. 若症狀持續並無改善，或發生下列症狀請立即與您的醫師聯絡：
高燒、失去意識、異常出血、喉嚨痛、皮膚潮紅或發癢起疹、眼睛或皮膚發生黃疸現象、尿液顏色變深。
3. 服用瑪爾胰®錠可能造成低血糖症狀請小心(請見低血糖症狀處理方法)。

■ 保存方法

1. 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 發生低血糖該怎麼辦?

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
 1. 血糖值小於 70 mg/dL：立即服用 120-180 毫升果汁或糖果 8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
 2. 血糖值小於 50 mg/dL：立即服用 180-250 毫升果汁或糖果 10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
 3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
 4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

■ 發生高血糖該怎麼辦?

- 症狀：例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。
- 處理方式：請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0002

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮