

藥品使用指導單

冠脂妥®膜衣錠 (Crestor® 10 mg)

■ 藥品成分名

Rosuvastatin

■ 藥品外觀

粉橘紅，圓形，錠劑；大小：0.7公分；標記：[ZD4522/10]

■ 作用

冠脂妥®膜衣錠用來降低血中過高的膽固醇，以減少心血管疾病及中風的發作。

■ 用法

本藥每天使用一次，服藥時間早晚不拘，隨餐或空腹均可。請依照醫師指示服用。

■ 注意事項

如果有下列情形請先知會您的醫（藥）師：

1. 曾對本藥或類似藥物過敏
2. 正在懷孕或哺乳，因此藥會傷害胎兒，故在服藥期間需確實避孕。
3. 正在服用其他藥物或健康食品
4. 有肝腎疾病、肌肉無自主能力病史者，並須定期檢測肝功能。
5. 有飲酒習慣的人。
6. 若您有正在服用下列的藥品，請告知您的醫師 或藥師：

A. 抗生素：Azithromycin（日舒錠）、Erythromycin（紅黴素）、
Clarithromycin（開羅理黴素）

B. 免疫抑制劑：Cyclosporine（新體睦）

C. 其他降血脂藥品：Gemfibrozil（脂福）、Fenofibrate（祛脂）。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿驚慌：頭痛、腹瀉、腹痛、嘔吐、胃腸脹氣、便秘，這些症狀會隨時間而慢慢減弱。
2. 若上述情況持續加重，或有下列情形發生，請立即與您的醫師聯絡：異常的肌肉疼痛、痙攣或不尋常的虛弱感、眼睛或皮膚四周出現黃疸現象、下背部疼痛、皮膚過敏。

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0003

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮