

藥品使用指導單

樂可舒®腸溶糖衣錠 (Dulcolax® 5 mg)

■ 藥品成分名

Bisacodyl

■ 藥品外觀

明黃色，圓凸形，錠劑；大小：0.60 公分；標記：無標記

■ 作用

1. 暫時緩解便秘。
2. 診斷及手術前清腸。

■ 用法

1. 請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或頻次。
2. 通常在服用後 6~8 小時才會產生藥效。
3. 樂可舒®腸溶糖衣錠為特殊的膜衣錠，可減少對胃刺激，請整粒吞服，不要咬碎。

■ 注意事項

1. 服用制酸劑或牛奶後 1 小時內，請勿服用樂可舒®腸溶糖衣錠。
2. 因樂可舒®腸溶糖衣錠不可磨粉，若需以鼻胃管餵食，請告知醫師。
3. 對樂可舒®腸溶糖衣錠過敏，請勿使用此藥。
4. 若您正懷孕、哺乳，或有胃痛、噁心、嘔吐、腸道蠕動功能急遽變化等情形，請先告知您的醫師。
5. 若您服用樂可舒®腸溶糖衣錠 1 星期後便秘情形沒有改善，請告知您的醫師。
6. 未經醫師指示，請不要將樂可舒®腸溶糖衣錠給小於 6 歲的兒童使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
腸道過度活動（腹絞痛、腹瀉、打嗝、噁心）、 肛門周圍有刺激感	停藥，若症狀嚴重時， 請與醫師聯繫
過敏反應（虛弱、暈眩、心悸、出汗、脹氣及疑似過敏的臉部紅腫與不適）	停藥並請與醫師聯繫

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0007

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮