

# 藥品使用指導單

## 抵克醣<sup>®</sup>錠 (Deglu<sup>®</sup> 50 mg)

### ■ 藥品成分名

Acarbose

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；標記：[110 LO]

### ■ 作用

抵克醣<sup>®</sup>錠用來治療第二型糖尿病患者，並藉由抑制腸道分解雙醣、寡醣及多醣，來延緩飯後血糖上升及降低您血中葡萄糖含量，使血糖維持在正常值。

### ■ 用法

1. 請遵照醫生指示服藥。
2. 用餐前服用，或於用餐時與前數口食物一起咬碎吞下。
3. 不可因為覺得沒有不舒服的症狀而自行停藥。

### ■ 注意事項

1. 若您有以下情形，請告知您的醫（藥）師。
  - (1) 若您是孕婦、哺乳中婦女、有肝腎方面疾病、有腸道疾病者。
  - (2) 若您對抵克醣<sup>®</sup>錠過敏。
2. 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制糖尿病症狀，有助於您的健康。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 每一個藥都會有副作用，若您出現腸胃不適、腹瀉、脹氣等，請勿驚慌。若上述症狀持續且加重，請聯絡您的醫師。
2. 若發生下述情形請立即就醫：眼睛或皮膚顏色變黃。
3. 單獨服用**抵克糖®錠**不治引起低血糖症。當併用其它降血糖用藥，發生急性低血糖症時，必須使用葡萄糖而非蔗糖。

## ■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0010-1

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮