

藥品使用指導單

美道普[®]錠 (Madopar[®] 250 mg)

■ 藥品成分名

Levodopa/Benserazide

■ 藥品外觀

淡紅色，圓扁形，錠劑；大小：1.3 公分；標記：[RO，C，HE]

■ 作用

美道普[®]錠可用於控制帕金森氏症，或緩解神經病變症狀。

■ 用法

1. 請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 美道普[®]錠需從低劑量開始服用，再慢慢增加劑量，請務必配合醫師指示的療程，以達到最適合您的療效。

■ 注意事項

1. 對美道普[®]錠過敏，請勿使用此藥。
2. 美道普[®]錠和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
3. 若您正服用抗癲癇藥（如：Phenytoin）、紅黴素（Erythromycin）、抗黴菌藥（如：Ketoconazole）、其他抗精神病藥物、降血壓藥，請告知您的醫師。
4. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝病、甲狀腺疾病、癲癇、阿茲海默症，及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
5. 不要喝酒精性飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
6. 服用美道普[®]錠期間，請按時回診及定期接受視力檢查。
7. 可能會讓您覺得頭暈，動作不協調、視線模糊、困倦，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。從事具潛在危險之活動（如開車、騎腳踏車、游泳等）應有人陪同。
8. 可能會使您容易體溫升高，當您運動或天氣較熱時，可多喝水會對您有幫助。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
頭暈	通常發生在剛開始服藥或改變劑量時，若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
動作無法控制（常發生在嘴唇、舌頭、四肢）、心跳過快、發燒盜汗、意識混淆、癲癇發作、肌肉僵直、視覺模糊有光暈、吞嚥困難、困倦	請立即與醫師聯繫

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0014

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮