

# 藥品使用指導單

## 脂福<sup>®</sup>錠 (GEMD<sup>®</sup> 600 mg)

### ■ 藥品成分名

Gemfibrozil

### ■ 藥品外觀

白色橢圓形錠劑；大小：2 公分；標記：[YSP/123]

### ■ 作用

脂福<sup>®</sup>錠用於降低血中三酸甘油脂（TG）、不好的膽固醇（LDL-C）以及增加好的膽固醇（HDL-C）血中濃度，以控制您的血脂接近正常值，可減少心血管疾病發生的機率。

### ■ 用法

依照醫師指示，因藥品易受食物影響療效，建議您於餐前 30 分鐘服藥。

### ■ 注意事項

如果有下列情形請先知會您的醫（藥）師：

1. 曾對本藥或類似藥物過敏。
2. 正在懷孕或哺乳，或有計畫懷孕者。
3. 正在服用其他藥物或健康食品，尤其是降血脂藥和抗凝血劑。
4. 有膽囊、肝腎疾病、膽結石病史者。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：拉肚子、嘔吐、脹氣、心灼熱感、頭暈，這些症狀會隨時間慢慢消失。

但是，當您有肌肉疼痛、不尋常的虛弱感、下背部疼痛、眼睛及皮膚產生黃疸現象、上腹部疼痛或疹子，請立刻聯絡您的醫生。

## ■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0020

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮