

# 藥品使用指導單

## 耐絞寧® 舌下錠 (Nitrostat® (NTG) 0.6 mg)

### ■ 藥品成分名

Nitroglycerin

### ■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；標記：[N/6]

### ■ 作用

耐絞寧® 舌下錠可鬆弛血管壁，進而改善心臟血液與氧氣之供應，用於緩解心絞痛的急性症狀（如胸痛、胸悶或呼吸困難等）。

### ■ 用法

1. 胸悶、胸痛時，應盡速找地方坐下，因藥效發揮時患者極可能會發生輕微頭痛、暈眩等反應。
2. 於心絞痛發作時含一粒耐絞寧舌下錠於舌下（並非含於舌上），若用藥5分鐘後症狀仍未緩解，則請再使用一粒（第2粒）；5分鐘後若仍無效者則可再用一粒（第3粒）。
3. 若已陸續使用過2粒而未能緩解症狀時，在使用第3粒同時，應馬上急電119，立即急診就醫，並告知醫師已使用過耐絞寧舌下錠。

### ■ 注意事項

1. 若您已採取坐姿但仍感暈眩時，可深呼吸數次後將身體前傾並將頭置放於兩膝間以緩解不適。
2. 若您曾因使用硝酸甘油製劑而發生藥物不良反應者，請先告知醫師。
3. 孕婦、授乳婦、低血壓患者、鬱血性心衰竭或腎臟疾病者請事先告知醫師。
4. 用藥後可能會導致您出現暈眩或頭痛等症狀，此為藥效發揮之常見反應，切勿因而自行停藥。
5. 用藥後應避免從事機械操作、開車等需集中注意力之工作以免危險。
6. 每次開瓶取藥時，請避免倒出過多藥粒或避免置於掌中過久再倒回藥罐以免藥物受潮而降低藥效；取藥後請儘速將瓶蓋扭緊。
7. 此藥勿與威而剛®（Viagra）併用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

服藥期間發生下述狀況時請立即回診就醫：

1. 過敏反應：如皮疹、蕁麻疹、嘴部或喉嚨有刺痛或腫脹感、呼吸困難。
2. 嘴唇或指甲出現藍色；意識不清、視力模糊、口乾、胸痛加劇或心跳減慢。
3. 持續出現臉部潮紅、噁心、嘔吐或等現象時

## ■ 保存方法

1. 耐絞寧舌下錠開瓶後保存期為**3-6個月**，可在瓶身上註明之有效期限以確保藥效。若未開封，保存期限則依瓶身上註明之期限。
2. 耐絞寧舌下錠應保存於原藥罐中，切勿自行隨意分裝。此藥若長時間接觸空氣、濕、熱極易降低藥效，故開封後請於每次使用後立即將瓶蓋扭緊並置於陰涼乾燥處保存，以確保藥效。
3. 藥品請置於室溫避光保存，避免存放於冰箱或浴室櫥櫃。
4. 請將藥品存放於兒童不易取得的地方。
5. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0032

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮