

# 藥品使用指導單

## 乙醯胺基硫唑嘧<sup>®</sup>錠 (Acetazolamide<sup>®</sup> 250 mg)

### ■ 藥品成分名

Acetazolamide

### ■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：0.95 公分；標記：[401]

### ■ 作用

乙醯胺基硫唑嘧<sup>®</sup>錠為一種口服的利尿劑，可用來治療青光眼/預防高山症/癲癇之輔助治療。

### ■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用，建議隨餐服用以減少腸胃不適。
- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

### ■ 注意事項

- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 懷孕婦女禁止使用此藥。
- 此藥可能使血糖升高，因此患有糖尿病的人，應該注意血糖狀況。
- 服用本藥期間建議補充大量水分來降低腎結石形成的風險。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：噁心嘔吐、感覺異常、食慾不振、嗜睡、倦怠感。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：耳鳴、排尿困難、四肢鈍重感、視覺模糊、眼睛或皮膚變黃、抽筋等情形，請立即就醫。
- 服用此藥會因其利尿作用而增加病患如廁的頻率。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0040

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮