

藥品使用指導單

樂命達®錠 (Lamictal® 50 mg)

■ 藥品成分名

Lamotrigine

■ 藥品外觀

淡黃橙色，正方形，錠劑，大小：0.75 公分，標記：[LAMICTAL，50]

■ 作用

樂命達®錠可用於單獨或與其他藥品一起使用治療並預防癲癇發作，亦有調節情緒的作用。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 可於飯前或是飯後服用！

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 此藥物會分泌至母乳中，有哺乳需求的患者，應先告知您的醫生及藥師。
- 須定期看醫生評估治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，請以醫師指示的方式調整。
- 老年人或腎功能不全之患者，應考慮調整劑量或服用次數，避免副作用產生。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用為頭痛、嗜睡、皮膚紅疹、暈眩、視力模糊、易怒等。
- 有時會發生食慾不振、噁心嘔吐等副作用。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 可能增加跌倒的風險

- 服用此藥物可能會產生暈眩、嗜睡、視力模糊等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。
- 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0045

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮