

# 藥品使用指導單

## 可蘇多<sup>®</sup>錠 (Casodex<sup>®</sup> 50 mg)

### ■ 藥品成分名

Bicalutamide

### ■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.65 公分；標記：[Cdx, 50][特殊標記]

### ■ 作用

可蘇多<sup>®</sup>錠用於治療攝護腺癌。

### ■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 一般使用劑量：每天一次，每次一錠，於固定時間服用。

### ■ 注意事項

- 有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 藥品可能影響肝功能，如有下列症狀：面色黯黃、噁心、嘔吐、腹痛、疲倦、虛弱、厭食、深色尿等，須告知醫師。
- 若您正服用其它藥品，特別是抗凝血劑（如可化凝、歐服寧），需告知醫師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知醫師：噁心嘔吐、食慾不振、手腳水腫、眼睛或皮膚變黃、胸悶胸痛、便秘、腹瀉、頭暈、熱潮紅、虛弱。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0046

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮