

藥品使用指導單

莫鼻卡®持續性藥效錠 (Lorapseudo® SR)

■ 藥品成分名

Loratadine 5 mg/ Pseudoephedrine sulfate 120 mg

■ 藥品外觀

白色圓形雙凸錠；大小：1.0 公分；標記：[無特殊標記]。

■ 作用

莫鼻卡®持續性藥效錠為複方產品，主要緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀，如鼻塞、打噴嚏、流鼻水、搔癢及流眼淚。

■ 用法

- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 請整顆吞服，不可磨粉、剝半或嚼碎。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 本藥品可能會有嗜睡、頭痛的副作用，使用後應避免開車及操作機械等危險動作。
- 狹角性青光眼、尿滯留、重度高血壓、重度冠狀動脈疾病之病人，應避免使用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形請不用驚慌：嗜睡、疲倦、頭痛、口渴、失眠、心跳過速等。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：臉、唇或喉嚨水腫、不明原因的發燒、畏寒、不規則心跳或心跳快速、呼吸困難或抽搐等，請立即停藥並就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 預防藥物造成跌倒

- 使用抗組織胺藥物可能影響嗜睡、注意力、警覺心、活動力等，易造成跌倒等意外。
- 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0048

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮