

# 藥品使用指導單

## 得安緒<sup>®</sup>錠 (Deanxit<sup>®</sup>)

### ■ 藥品成分名

Flupentixol 0.5 mg/Melitracen 10 mg

### ■ 藥品外觀

桃紅偏明紫色，圓凸形，錠劑；大小：0.7 公分

### ■ 作用

得安緒<sup>®</sup>錠治療情緒低落、緩和焦慮相關症狀。

### ■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

### ■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳、或有心臟疾病、青光眼，應告知您的醫師及藥師。
- 服用藥品應避免喝酒。
- 此藥物會產生嗜睡、有倦怠感之症狀，患者避免從事需精神集中之工作，並且慎防跌倒。
- 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：嗜睡、焦慮、口乾舌燥、便秘、視線模糊。
- 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0053

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮