

# 藥品使用指導單

## 愛治®膠囊 (Hydrea® 500 mg)

### ■ 藥品成分名

Hydroxyurea

### ■ 藥品外觀

淡綠/淺紅，長圓柱形硬膠囊；大小：00 號；標記：[BMS，303][BMS，303]

### ■ 作用

愛治®膠囊為抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。

### ■ 用法

請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

### ■ 注意事項

- 若您已知對此類藥物過敏或有骨髓(白血球減少症、血小板減少症和貧血)、腎臟、肝臟或貧血方面疾病，請先告訴您的醫師。
- 使用本藥後可能會造成噁心嘔吐或食慾不振，可以少量多餐的方式進食，並且多漱口加強口腔衛生。
- 女性有懷孕或哺乳時請先主動告知您的醫師。愛治®膠囊可能會傷害胎兒，因此若在接受治療期間或治療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，治療期間請確實做好避孕措施。
- 應提醒將膠囊內成分倒入水中服用的病人，此藥物為強效藥物，必須小心處理。病人必須小心不要讓粉劑接觸到皮膚和黏膜，包括在打開膠囊時必須避免吸入粉劑。
- 為減低接觸的風險，處理愛治®膠囊時，請穿戴拋棄式手套，並且在接觸瓶子或膠囊前後，均應清洗雙手。若粉劑潑撒出來，應立即使用浸濕的拋棄式毛巾拭淨，並置於塑膠袋等密閉的容器中丟棄。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、發燒、噁心嘔吐、胃痛、腹瀉或便秘、虛弱、寒顫、喉嚨痛、咳嗽、口腔炎、罕見的頭痛、頭暈。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存，並關緊瓶蓋。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0068

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮