

藥品使用指導單

鋰齊寧[®]膠囊 (Ligilin[®] 300 mg)

■ 藥品成分名

Lithium carbonate

■ 藥品外觀

淡黃橙色，長圓柱形，硬膠囊；大小：3 號；標記：[SOLVAY][7512]

■ 作用

鋰齊寧[®]膠囊用於情緒改善與調節，治療躁病、預防躁鬱病。

■ 用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

■ 注意事項

- 有腎臟及心臟血管疾患、甲狀腺疾病、嚴重衰弱、脫水、鈉缺失，或有服用利尿劑、止痛藥、調節精神藥物者，應告知您的醫師及藥師。
- 懷孕、哺乳者不建議服用此藥。
- 12 歲以下兒童不建議服用此藥。
- 已知對本藥產生過敏反應者不建議使用。
- 服用此藥者應維持正常飲食包括鹽及水分(2500~3000ml)的攝取。
- 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。
- 服用此藥可能會造成頭暈、嗜睡，應避免開車或操作機械。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：腹脹、嘔吐、倦睡、口渴。當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師。
- 如果出現較嚴重副作用，如：眩暈、運動失調、視野模糊、耳鳴及多尿等症狀，請立即告知您的醫師或立即就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0073

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮