

藥品使用指導單

美舒鬱[®]錠 (Mesyrel[®] 50 mg)

■ 藥品成分名

Trazodone

■ 藥品外觀

淡紅橙，圓扁形，錠劑；大小：0.80 公分；標記：[LO]

■ 作用

美舒鬱[®]錠具有調節情緒、調整睡眠的作用。

■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 若您為18歲以下、計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 服用此藥避免喝酒。
- 服藥期間請勿操作機器或開車。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、體重減輕、震顫、口乾、心搏過慢或過快、姿態性低血壓、便秘、下痢、視覺模糊、痙攣、水腫及皮膚疹等。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0075

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮