

# 藥品使用指導單

## 溫諾平®軟膠囊 (Navelbine® 20 / 30 mg)

### ■ 藥品成分名

Vinorelbine

### ■ 藥品外觀

Navelbine® 20 mg：淺黃色，長圓柱形，軟膠囊；標記：[N20]

Navelbine® 30 mg：淺粉紅色，長圓柱形，軟膠囊；標記：[N30]

### ■ 作用

溫諾平®軟膠囊會干擾您體內癌細胞的生長，可用於治療癌症。

### ■ 用法

- 請依照醫師指示按時服用，不可自行增減藥量或任意停藥。
- 請於用餐時以水整顆吞服，不可嚼食或剝開膠囊，建議與食物同時服用，補充足夠水分以增加尿液排出量。
- 如何使用溫諾平軟膠囊：先打開防止誤開的包裝，沿著黑線剪開包裝，移去塑膠包膜，將膠囊由鋁箔推出。

### ■ 注意事項

- 若您曾對此類藥物過敏，或有肝、腎、肺臟疾病，請先告訴您的醫師。
- 因膠囊內含藥品具有刺激性，不慎接觸膠囊內液時（如不慎嚼食或咬破膠囊），請使用大量清水漱口或用生理食鹽水更佳。破損的膠囊不可吞食，請退還醫師或藥師處以正確的方法予以銷毀。
- 如在服藥後數小時有嘔吐的情形發生，勿重複投予此劑量，並可給止吐藥，降低嘔吐的發生。
- 因本藥含有山梨醇，對果糖無耐受性者不可服用。
- 在服藥期間應避免大量飲用葡萄柚汁。
- 若計畫要打疫苗，必須先告知醫師正在服用此藥。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：頭暈、頭痛、疲倦、噁心、嘔吐、便祕、皮膚疹、失眠、感覺與運動神經異常、咳嗽、輕微毛髮脫落、疲勞。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！

## ■ 保存方法

- 儲存溫度須於2-8°C，維持原始包裝儲存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0080

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮