

# 藥品使用指導單

## 利瑞卡<sup>®</sup>膠囊 (Lyrica<sup>®</sup> 75 mg)

### ■ 藥品成分名

Pregabalin

### ■ 藥品外觀

白/紅棕，長圓柱形，硬膠囊，標記：[pfizer][PGN 75]

### ■ 作用

利瑞卡<sup>®</sup>膠囊為一種神經治療劑，作用在中樞神經上達到止痛或抗癲癇的效果。

### ■ 用法

- 1.請依照藥袋上標示或醫師指示用量與用法服用。
- 2.可於飯後或空腹服用。

### ■ 注意事項

- 1.服藥後若感到眼睛、顏面腫脹、呼吸困難、皮膚紅疹、水泡等，請立刻停藥並告知您的醫生及藥師。
- 2.本藥品服用後可能引起頭暈、嗜睡，服用後應避免操作具危險性的器械及飲酒。
- 3.懷孕、正在哺乳的婦女或腎功能異常者請事先告知醫師。
- 4.若您需要使用其他藥物、健康食品，請事先告知您的醫師及藥師，避免食物、藥物的交互作用。
- 5.體重增加、口乾、視力模糊、疲勞為可能的副作用，若發生後無法忍受，請回診告知醫師及藥師進行調整。
- 6.要停止服用此藥時，應以至少一週的時間逐漸減量。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 1.若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 2.若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 3.不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



## ■ 可能的副作用

1. 服藥後若有頭暈、疲倦、便秘、口乾情形，請您不用驚慌。
2. 若有以下副作用發生：皮膚紅疹、異常眩暈、情緒抑鬱、呼吸困難、異常出血症狀，請立即停藥，並聯絡您的醫師或藥師。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0081

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮