

# 藥品使用指導單

## 釋痙<sup>®</sup>膜衣錠 (Soverine<sup>®</sup> 60 mg)

### ■ 藥品成分名

Alverine citrate

### ■ 藥品外觀

淺灰/淺青，長圓柱形，硬膠囊；標記：[Shou][Chan]

### ■ 作用

釋痙<sup>®</sup>錠用於緩解消化道痙攣。

### ■ 用法

請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

### ■ 注意事項

1. 孕婦、哺乳婦女、吞嚥困難者不應使用。
2. 十二歲以下兒童，不建議使用。
3. 此藥物會產生頭痛、暈眩症狀，患者避免從事需精神集中之工作，服用本藥期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### ■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：虛弱、頭昏眼花、頭痛、過敏發疹。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0094

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮