

# 藥品使用指導單

## 便通樂®膜衣錠 (Through® Tablets 20mg)

### ■ 藥品成分名

每顆內含 Sennoside A+B 合劑。

### ■ 藥品外觀

土黃色，圓形，錠劑；大小：0.70 公分。

### ■ 作用

便通樂®錠作用為直接刺激大腸壁，促進大腸蠕動，產生緩瀉作用。

### ■ 用法

1. 便通樂®錠作用緩慢，因此就在寢前服用，翌晨即可有效果。
2. 成人一日可服用 1-2 錠，可依年齡、症狀適量增減。

### ■ 注意事項

1. 長期使用會產生依賴，使腸道失去原有機能及電解質失衡。
2. 請多補充水分及膳食纖維幫助排便。
3. 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌到，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。  
預防方式：  
(1) 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手站穩踏階以防跌倒受傷。  
(2) 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。
4. 若排便恢復正常，即可停藥。
5. 使用一星期以上排便狀況仍未改善，請告知醫師或藥師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 如有下列常見之副作用請不用驚慌：腹絞痛、腹痛、打嗝、噁心，電解質失衡等。
2. 若有過敏反應，如虛弱、暈眩、心悸、劇烈絞痛、血便或肛門出血等，請立即停藥並就醫！

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0095

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮