

藥品使用指導單

紓癌特®膠囊 (Sutent® 12.5 mg)

■ 藥品成分名

Sunitinib

■ 藥品外觀

深紅色，長圓柱形，膠囊；標記：[Pfizer][12.5mg]

■ 作用

紓癌特®膠囊為一種抗腫瘤藥物，用於治療癌症。

■ 用法

- 1.請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
- 2.紓癌特可隨餐服用，亦可空腹服用；若出現胃部不適可與食物併服。
- 3.膠囊不可打開也不可嚼碎。

■ 注意事項

1. 有肝、心臟疾病，應告知您的醫（藥）師。
2. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
3. 盡量避免或減少攝取酒精性飲料，避免飲用大量葡萄柚汁，以免影響藥品的代謝及療效。
4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
5. 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑、大蒜、人蔘、銀杏或維他命E等等，請在服用這些藥物前告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

1. 使用本藥後可能會造成噁心或嘔吐，以少量多餐的方式進食並且多漱口以加強口腔衛生。
2. 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須小心受傷，建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。
3. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛、口乾、手腳麻、水腫、視力模糊、舌頭麻、味覺改變。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請帶回醫院或藥局回收，不應隨便丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0098

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮