

# 藥品使用指導單

## 特莫斯®膠囊 (Tamos® 20/100 mg)

### ■ 藥品成分名

Temozolomide

### ■ 藥品外觀

- Tamos® 20 mg：橘黃色/白色，硬膠囊；標記：[ LP / 605 ]
- Tamos® 100 mg：粉膚色/白色，硬膠囊；標記：[ LP / 206 ]

### ■ 作用

特莫斯®膠囊為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。

### ■ 用法

1. 按醫師指示服用，因藥品易受食物影響，空腹（飯前1小時或飯後2小時）服用效果較好。
2. 配開水整粒吞服，絕對不可以打開膠囊或咀嚼服用。

### ■ 注意事項

1. 若您已知對此類藥物過敏或達卡巴仁（Dacarbazine）過敏或有出血的問題時，請先告訴您的醫師。
2. 如有肝臟疾病，應告知您的醫（藥）師。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
5. 若您要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。
6. 因服用藥物容易發生噁心嘔吐，可以先服用止吐劑預防。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請不用緊張：噁心嘔吐、食慾不振、腹瀉、便秘、咳嗽、喉嚨痛、落髮、頭暈、頭痛。
2. 若有以下情形，請盡速就醫：皮膚紅疹、尿液及糞便顏色變深、發燒、不正常出血、抽搐。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請帶至醫療院所丟棄，勿隨意丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0100

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮