

藥品使用指導單

妥富腦[®]錠 (Tofranil[®] 25 mg)

■ 藥品成分名

Imipramine HCl

■ 藥品外觀

橘紅色，圓形，錠劑

■ 作用

妥富腦[®]錠可用來調整精神狀態或治療夜尿症。

■ 用法

- 當量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 若您曾對於此藥品成份過敏、將進行外科手術或正在服用其它抗憂鬱藥，請事先告知醫師。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病、青光眼、甲狀腺疾病、攝護腺疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 服用此藥物可能造成視力模糊，請避免操作機械及開車。
- 服用此藥初期或劑量有改變時，容易有眩暈、視力模糊，甚至肌肉僵硬、行動緩慢，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，請特別注意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥品都有副作用，但不是每個人都會發生，若有以下情形，請您不用驚慌：口乾、便秘、流汗、面潮紅、視覺模糊、姿態性低血壓、疲倦、焦慮、噁心、嘔吐、排尿困難、皮膚過敏、頭暈、頭痛、睡眠障礙。
- 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0103

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮