

# 藥品使用指導單

## 特良高朗<sup>®</sup>錠 (Trancolon<sup>®</sup> 7.5 mg)

### ■ 藥品成分名

Mepenzolate bromide

### ■ 藥品外觀

淡紅色，圓扁形，錠劑；大小：0.60 公分；標記：[434]

### ■ 作用

特良高朗<sup>®</sup>膜衣錠是用來治療激躁大腸症所引起的大腸機能異常的藥物。

### ■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋或按照醫師的指示服用。

### ■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 服用此藥期間不建議懷孕或哺乳。
- 對於青光眼、前列腺肥大、麻痺性腸阻塞，或曾對本藥成份過敏之患者，請勿服用此藥物。
- 甲狀腺機能亢進、在高溫環境工作之患者、有潰瘍性大腸炎之患者，以及老年人，建議於謹慎監測下酌量降低服用的劑量。
- 此藥物會產生頭痛暈眩及視力調節障礙症狀，患者避免從事需精神集中之工作，服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。
- 若有服用抗憂鬱藥、精神調節藥品、抗組織胺，請告知您的醫師或藥師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：噁心、嘔吐、口渴、便秘、食慾不振、視力調節障礙、排尿障礙、暈眩、發疹。
- 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0105

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮