

藥品使用指導單

悅康[®]持續藥效膠囊 (Easyfor[®] SR 75mg)

■ 藥品成分名

Venlafaxine

■ 藥品外觀

淡粉紅色，膠囊；標記：[N.K.P.476] [N.K.P.476]

■ 作用

悅康[®]持續藥效膠囊可用來調整情緒。

■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎臟疾病，或曾對此藥品成分過敏，應告知您的醫生或藥師。
- 服用此藥品不建議懷孕或哺乳。
- 服用此藥品可能會增加出血的風險，因此如果有併用阿斯匹靈、抗凝血劑請先告知您的醫師或藥師。
- 服用此藥品可能造成視力模糊，請避免操作機械及開車，服用本藥期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。
- 服用藥物期間請避免飲酒。
- 若有計畫停藥時，請遵循醫師的指示以漸進式方式停藥，以避免發生戒斷症狀(精神激昂、厭食、焦慮、頭痛、耳鳴...等)。
- 服用此藥品可能造成血壓升高，治療期間請定期量血壓，觀察血壓變化。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：噁心、嘔吐、口乾、焦慮、嗜睡、暈眩、血壓升高、盜汗、厭食、便秘、性慾降低。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較嚴重的副作用，請立即就醫：異常出血、低鈉血症(頭痛、注意力難集中、記憶障礙、幻覺、暈厥、抽蓄、昏迷)、持續性呼吸困難、胸口不適。

■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0110

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮