

藥品使用指導單

穩舒眠[®]錠 (Winsumin[®] 12.5mg)

■ 藥品成分名

Chlorpromazine

■ 藥品外觀

紫色，圓凸形，大小：0.7 公分

■ 作用

穩舒眠[®]糖衣錠為口服抗精神病製劑，主要適應症為精神疾病、噁心嘔吐，也常用於處理呃逆(打嗝)的狀況。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 劑量應隨個人加以調整，每個患者均應自最低有效劑量開始使用。
- 如要結束療程，建議在一到兩個星期內逐漸降低劑量，病患切勿自行停藥。

■ 注意事項

- 若您有計畫（已）懷孕、哺乳、肝或腎功能不全、心血管疾病病史之病人、巴金森氏症、青光眼、消化性潰瘍、前列腺肥大、尿滯留症，請主動告知您的醫師或藥師。
- 服用此藥期間不建議哺乳。
- 使用本藥可能會影響駕駛和機械操作能力，執行此類動作時請多加注意。
- 使用本藥請勿喝酒或抽菸。
- 可與食物或牛乳併服，降低腸胃道刺激。
- 服用本藥一小時內禁止服用制酸劑或瀉劑。
- 服用本藥尿液顏色可能改變，不需驚慌。
- 由躺著或坐著要站起來時，動作要緩慢，避免頭暈跌倒。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：頭暈、姿勢性低血壓、口乾、頭痛、暈眩、排尿困難、便秘。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！
- 若出現較嚴重副作用，請立即就醫：心臟疾患之惡化，持續高熱，意識障礙。

■ 注意跌倒之預防

- 服用穩舒眠[®]糖衣錠，易造成姿勢性低血壓，暈眩，椎體外徑作用，例如震顫，肌肉僵直，混亂、感覺遲鈍、姿勢不穩，而有跌倒的副作用。
- 服用此藥的期間，需特別注意跌倒的預防，請勿由躺著或坐著突然站立，尤其是初次使用、年老之病患或長期服用的病患劑量增加時。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0114

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮