

# 藥品使用指導單

## 安得卡<sup>®</sup>錠 (Androcur<sup>®</sup> 50 mg)

### ■ 藥品成分名

Cyproterone acetate

### ■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.9 公分；標記：[BV]

### ■ 作用

男性使用安得卡<sup>®</sup>錠為一種治療前列腺腫瘤的藥品，能拮抗體內雄性素；女性可使用於嚴重的男性化症狀、青春痘以及多毛症。

### ■ 用法

此藥因為有多種適應症，請依照醫師指示的時間和方式服用。

### ■ 注意事項

- 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- 若您有心血管疾病、腎功能或肝功能不良，請告知您的醫（藥）師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師，本藥會傷害胎兒，必要時須避孕。
- 若您有糖尿病，因為本品有造成血管栓塞的風險，請務必讓醫（藥）師了解您的病情。
- 服用藥品期間，會造成疲倦、體力衰退以及降低專注力，有開車及操作機械者請特別小心。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 使用本藥品治療期間，性衝動及能力會減低，精子生成會受到抑制，但這些在停藥後是可恢復的。
- 本品常會引起男性乳房增殖症（有時併有乳頭觸痛感），停藥後通常會恢復。
- 與其他抗雄性素治療相同，長期使用本品會增加骨質疏鬆風險。
- 若有下述症狀請立刻就醫：嚴重腹瀉、手或腳紅腫、麻木或疼痛、發燒、寒顫、喉嚨痛、胸痛、發疹、食慾降低、嚴重嘔吐等。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0126

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮