

藥品使用指導單

復乳納[®]膜衣錠 (Femara[®] 2.5 mg)

■ 藥品成分名

Letrozole

■ 藥品外觀

暗黃色，圓扁形，錠劑；大小：0.6 公分；標記：[FV][CG]

■ 作用

復乳納[®]膜衣錠為停經後荷爾蒙接受器呈陽性反應的初期乳癌病人之輔助治療藥物，或停經後之局部晚期或轉移性乳癌婦女之第一線治療用藥。

■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 一般使用劑量：一天 1 錠 2.5 mg，一天 1 次，於固定時間服用。

■ 注意事項

- 有肝臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 本藥有可能提高發生骨質疏鬆或骨折的風險，請在服藥期間注意骨質狀況，必要時可補充鈣質及維生素 D。
- 本藥品禁止於懷孕或授乳期間使用。
- 本藥品可能會造成疲勞和頭昏，若您有開車或操作機器時請注意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，一陣子後會緩解，請不用擔心：
熱潮紅、關節痛、噁心及疲勞。
- 若上述症狀持續加重，請告知醫師。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0129

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮