

# 藥品使用指導單

## 山喜多<sup>®</sup>膠囊 (Cellcept<sup>®</sup> 250 mg)

### ■ 藥品成分名

Mycophenolate mofetil (MMF)

### ■ 藥品外觀

藥品外觀：藍色/棕色；長圓柱形；膠囊；標記：[Roche；CellCept 250]

### ■ 作用

山喜多<sup>®</sup>膠囊為口服的免疫抑制劑，可預防器官移植後之排斥反應。

### ■ 用法

1. 每隔 12 小時服用一次，空腹使用，本藥須整粒吞服，不要打開膠囊。
2. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用，切勿擅自停藥或更改劑量。
3. 與普樂可復 (Prograf<sup>®</sup>) 併用時，兩者至少相隔 2 小時，以免腸胃不適。

### ■ 注意事項

1. 本藥品具胎兒致畸性，服藥期間應避孕及停止哺乳，停藥後 6 週才考慮懷孕。
2. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生。
3. 不應將膠囊打開或弄碎，若不慎接觸膠囊內所含的粉末，應立刻以肥皂水徹底清洗，若接觸到眼睛或黏膜部位，應以大量清水沖洗。
4. 在本藥品治療期間，若接種疫苗其效果可能較差且應避免使用減毒活性疫苗。接種流行性感感冒疫苗可能是有利益的，可經醫師評估後接種。
5. 服藥期間免疫力較低，應避免出入人潮多的地方、接觸有感冒或其他感染症的人，並注意個人衛生。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 發現時趕快服用，若距離下次吃藥時間小於 4 小時以內，則跳過此次，只需按照時間服用下一次藥量，絕對不要服用雙倍藥量。
2. 若忘記 2 劑以上，應與您的醫師聯絡。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

1. 副作用的發生因人而異，若有以下情形，請告訴醫師或藥師：頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、失眠、胃痛、消化不良等。
2. 若服藥後出現過敏反應（呼吸困難、臉部腫脹）、異常瘀青或出血、排尿減少或疼痛、發燒、黑便、口腔有白色斑點等症狀，請立即就醫。

## ■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

## ■ 藥品交互作用

1. 服用山喜多<sup>®</sup>期間未經醫師同意，請勿自行服用其他中草藥、維他命或處方藥物（例如：Acyclovir、Ganciclovir、Azathioprine、Cholestyramine、Cyclosporin、Tacrolimus）等。
2. 若與含鎂、鋁成分之胃藥一起服用，需間隔 2 小時以上。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0132

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮