

藥品使用指導單

可樂喜定[®]錠 (Colchicine[®] 0.5 mg)

■ 藥品成分名

Colchicine

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.70 公分；標記：[592]

■ 作用

可樂喜定[®]錠為治療痛風的口服藥品，可減少白血球移向發炎關節組織以及減少關節尿酸結晶和乳酸的生成，進而減輕關節發炎的反應。

■ 用法

1. 請於痛風發作的預感出現時開始服用，或於痛風第一次發作時立刻開始服用。
2. 請依照醫師指示用量與用法服用；一般用於急性發作期，不建議用於長期預防。

■ 注意事項

1. 服藥後若感到噁心、嘔吐、腹瀉等，請立刻停藥並知您的醫生及藥師。
2. 若作為長期的預防性使用，可能會有肝、腎功能傷害，請務必向醫師確認後再使用。
3. 懷孕或曾經有胃、腸潰瘍，肝、腎功能異常者請事先告知醫師。
4. 服藥期間請避免飲酒。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0136

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮