

藥品使用指導單

拜瑞妥®膜衣錠 (Xarelto® 10/15 mg)

■ 藥品成分名

Rivaroxaban

■ 藥品外觀

Xarelto 10 mg：淡紅色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分；標記：[Bayer][▽10]

Xarelto 15 mg：紅色，圓型，雙面突起膜衣錠，標記：[Bayer][▽15]

■ 作用

拜瑞妥®膜衣錠是一種抗凝血劑，可以防止血栓形成，減少血管阻塞的危險；可預防中風及全身靜脈栓塞、治療或預防深部靜脈血栓及肺栓塞、預防下肢重大骨科手術後的靜脈血栓栓塞症。

■ 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 請隨餐服用。
3. 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次；無法吞嚥錠劑之患者可將膜衣錠壓碎後混入水中喝下，該混合藥液亦可透過鼻胃管給藥。

■ 注意事項

1. 讓所有照顧您的醫療人員知道您正服用此藥。特別於動任何手術或進行任何侵入性治療前，請先告知您的醫師，您正在服用此藥品。
2. 在任何情況下(包含拔牙及手術)，若沒有事先與原開藥醫師討論，不得自行停用此藥品，因為可能增加您出現血栓與中風的風險。
3. 盡量避免酒精性飲料和葡萄柚汁的攝取。若不確定其他藥品是否會與拜瑞妥產生交互作用時，請詢問醫師或藥師。
4. 服藥前，請確實告知醫師是否曾有出血問題（不正常瘀血或流鼻血現象或經期過長）、肝腎疾病、藥物過敏等問題。
5. 若已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。
6. 應盡量避免從事易引起外傷之危險活動。小心使用牙刷或刮鬍刀，盡量選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀。
7. 確定身邊有足夠藥量，並遵循醫師指示服藥。
8. 請勿自行更換不同廠牌之藥品。
9. 若有不正常出血情況(如鼻出血、糞便顏色突然變深或刷牙有血絲等)，請立即告知您的主治醫師或就近就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：腹瀉、噁心嘔吐、失眠、疲倦。
2. 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：皮膚紅腫、潰爛，大水泡的發疹，表皮壞死，黃疸，嚴重肝臟問題。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 如果在預計服藥時間未服用本品，則於同一天內儘速服用，並於隔日依原定時間服用一次。
2. 若不小心服用過量，請立即告知您的主治醫師或就近就醫。

■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處（30℃以下）、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 2021.01
- PFS-7200-0138

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮