

藥品使用指導單

逸潰定®膠囊 (Lansoprazole 30 mg)

■ 藥品成分名

Lansoprazole

■ 藥品外觀

米白色膠囊；標記：[CCP][B58]

■ 作用

逸潰定®可用於治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃食道逆流性疾病，以及合併抗生素治療幽門螺旋桿菌相關的消化性潰瘍等。

■ 用法

- 逸潰定®膠囊應整顆吞服，不可咬碎或嚼食。
- 若吞嚥膠囊有困難的患者，可以打開逸潰定®膠囊，將顆粒狀的內容物灑在少量(60 c.c.)的蘋果汁、柳橙汁或蕃茄汁中，稍作攪拌後立即吞服。為確保服用完整劑量，應再用2倍以上份量的果汁沖入杯子後再喝下，請不要咬碎內含之顆粒。

■ 注意事項

- 對逸潰定®或其他賦形劑過敏者，請勿使用此藥。
- 有任何胃腸道症狀時，請先讓醫師知悉、評估您的症狀，以免延誤其他潛在性疾病的治療。
- 正在服用其他藥物者，請先告知您的醫(藥)師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一個藥都有副作用，也不是每一個人都有可能這些副作用。若您有以下症狀：週邊水腫、輕微失眠、頭痛、眩暈、腹痛、腹脹、便秘、腹瀉、噁心/嘔吐等，這些症狀會隨時間而減弱。
- 若上述情況持續加重，或者有下列症狀：嚴重發燒、情緒不安、視覺模糊、嚴重疲倦或嚴重皮膚紅疹，請立即與醫師聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/ 2021.01
- PFS-7200-0141

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮